


バリウム検査は、なぜ発泡剤を飲むの？ ゲップはダメ？



バリウムの検査は「ゲップを我慢しなきゃいけない！」

と強いプレッシャーを感じている方が多くいらっしゃいます。

では、なぜゲップしてはいけないのでしょうか？




胃のバリウム検査は、発泡剤を飲んで胃を膨らませます。

胃を膨らませることによって胃の粘膜をしっかりと観察することができます。

ゲップをしてしまうと、胃がしぼんで胃の観察が難しくなるため、

できるだけゲップを我慢していただきます。



★ 発泡剤の飲み方のコツ ★

発泡剤は顆粒状です。

少量の薄めたバリウムと一緒に

飲み込んでいただきます。



発泡剤(顆粒状)

発泡剤は水分に反応して発泡するため、口の中で時間が経つと泡になって飲み込みづらくなってしまいます。

そのため、**口の中で溶かさず、**

バリウムで流し込むように飲んでください。

発泡剤を飲用する際、


一気ではなく数回に分けて飲用するのもおすすめです。



①発泡剤



②薄めたバリウム




～??ゲップしてしまったらやり直し??～

ゲップがでた場合でも、追加で発泡剤を飲めば、胃がまた膨らみ、**検査が再開**できます。**最初から撮りなおす必要はありません。**

あまり強くプレッシャーを感じ過ぎず、
リラックスして検査していきましょう♪

<発泡剤追加前>



<発泡剤追加後>



※ゲップが出やすく心配な方はスタッフにご相談ください。

